

Rabia paralitica bovina

(ZONOSIS)

Enfermedad mortal causada por un virus que infecta a los mamíferos principalmente a los vacunos, porcinos, equinos, entre otros. Es un problema de salud pública porque afecta a los humanos poniendo en riesgo su vida. El principal transmisor es el murciélago (vampiro) hematófago (se alimentan de sangre) el cual causa daños económicos considerables. Conocida también como derriengue.

SÍNTOMAS

En los herbívoros el principal síntoma es la parálisis

- Parálisis de sus miembros posteriores (patas) que les impide levantarse.
- En la fase inicial los animales emiten mugidos frecuentes y roncacos, presentan dificultad para orinar y defecar y caminan tambaleándose.

- Salivación abundante y espumante.
- No pueden tragar.
- Muerte.

PREVENCIÓN

Las medidas deben ser conjuntas y sistemáticas: vacunación de los hatos y control de la población de los vampiros, por medio del uso de pasta anticoagulante (vampiricida) que es aplicada en las mordeduras de los animales afectados o en el dorso de los murciélagos capturados.

Para la captura de los vampiros se utilizan redes de niebla, actividad que se hace en los corrales de las fincas en las noches después de luna llena con redes de niebla, se debe coordinar con el Servicio Veterinario oficial (MAG).

El cerebro de animales con síntomas debe de examinarse para obtener un diagnóstico de laboratorio. El éxito de

una campaña oficial de control de Rabia depende de la participación de los productores, quienes deben vigilar los animales y notificar a la Dirección de Salud Animal del MAG para programar las capturas.

TRATAMIENTO

El mejor tratamiento es la prevención.

Para mayor información consulte a su médico veterinario.



Animal muerto por rabia paralitica