



Ubre inflamada

Es una inflamación de la ubre la cual afecta uno o varios cuartos, causada por diferentes microorganismos o microbios. Se transmite de un animal a otro por las manos del ordeñador o la máquina ordeñadora, por la suciedad de los corrales, establos o también por moscas.

SÍNTOMAS

Uno de los primeros síntomas de una mastitis es la presencia de grumos en las primeras porciones de leche ordeñada.

Se presentan 2 tipos de Mastitis:

1. Mastitis Clínica (se detecta a simple vista)

- El cuarto afectado se inflama, a veces se pone duro, falta de elasticidad y caliente.
- El ordeño resulta doloroso para el animal.
- Coloración rojiza de la piel.
- Disminución en la producción de leche.

- La leche pierde sus características de olor, color, sabor y puede presentar sangre, suero, pus, grumos.
- En la forma clínica puede haber comprometimiento de órganos, subir la fiebre, falta de apetito, infección generalizada, taquicardia y muerte.

2. Mastitis Subclínica (no se detecta a simple vista)

Para la detección de este tipo de Mastitis se aplica la Prueba de California

- La leche es aparentemente normal.
- Al realizar la prueba de California se detecta un aumento de células somáticas.

PREVENCIÓN

- Separar animales infectados de los sanos y ordeñar primero los sanos
- Lavar y desinfectar las manos del ordeñador con solución desinfectante.

- Limpiar las ubres de todas las vacas con una servilleta de papel para cada animal.
- Nunca ordeñar los cuartos infectados con máquina ordeñadora.
- Mantenimiento adecuado del equipo de ordeño.
- Manejo de las vacas en período seco.
- Tratamiento oportuno y apropiado de la mastitis durante la lactación.
- Desechar vacas infectadas crónicamente.
- Mantener un ambiente de bienestar apropiado para los animales.
- Tener un buen registro de datos.
- Controlar el estado de salud de las ubres.
- Revisión periódica del programa de manejo de la salud de la ubre.
- Lavar todos los equipos que se han puesto en contacto con leche infectada, con agua caliente y jabón y después desinfectar con una solución.

TRATAMIENTO

El tratamiento depende de cual es el agente patógeno que está causando la Mastitis. Pueden ser agentes patógenos contagiosos ambientales o microorganismos no muy frecuentes de encontrar, por lo que se recomienda un buen plan de manejo y cultivo de microorganismos y recuento de células somáticas en el laboratorio.

Introducir a través del conducto un tratamiento adecuado el cual se repetirá hasta que se consiga la curación.

Para mayor información consulte a su médico veterinario