

Leucosis viral bovina



Tumores en los ganglios intestinales

Enfermedad viral, crónica, progresiva y transmisible, no se detecta a simple vista. Se caracteriza por la formación de masas tumorales en diferentes órganos internos y una gran variedad de síntomas según el sitio de localización de los tumores.

SÍNTOMAS

- Adelgazamiento, debilidad.
- Disminución de la producción de leche.
- Aumento de temperatura.
- Disminución del apetito.

- Ganglios superficiales aumentados de tamaño.
- Debilidad de los miembros posteriores.
- Anemia.
- Aumento de temperatura.

PREVENCIÓN

Se debe eliminar los animales positivos. Su control busca erradicarla, consiste en limpiar aquellos hatos que tienen baja prevalencia de la enfermedad y proceder a la eliminación de los animales positivos.

Para evitar la enfermedad se debe:

- Utilizar equipo esterilizado.
- Utilizar agujas diferentes por animal.
- Controlar la propagación de los insectos que son vectores de la enfermedad, tales como los picadores.
- Determinar las líneas familiares de animales resistentes a la Leucosis con el fin de seleccionar los reemplazos.
- Introducir a la finca animales certificados como libres de la enfermedad.
- Utilizar el semen y los sementales libres de la infección.
- Impedir que los terneros reciban el calostro de sus madres cuando estas son portadoras de la enfermedad.

TRATAMIENTO

El mejor tratamiento es la prevención.

Para mayor información consulte a su médico veterinario.

